

ベーシック プロセス

パッチテスト	48 時間前に実施します。
毛髪診断	毛質、履歴、頭皮の状態を診断します。
薬剤選定	使用するカラーを選定します。
前処理	必要に応じてダメージ部分等に処理をします。
ブロッキング	塗布順序により 4 ～ 6 ブロックにします。
薬剤混合	塗布直前に 1 剤：2 剤（1：1）で混合します。
薬剤塗布	塗布順序や塗布量を考慮して塗布します。
放置タイム	毛質やアンダートーンにより 15 分～ 40 分自然放置します。
カラーチェック	薬剤を一部拭き取り、明度・色調を確認します。
中間処理	必要に応じて中間処理剤を使用して、コーミングまたは乳化します。
シャンプー	ぬるま湯でよく流してからシャンプー・トリートメントをします。



ラインナップ



グリジオ カラー

1 剤【酸化染毛剤】
（医薬部外品）
内容量 / 各 60g × 3 本

アミノ酸系湿润剤をベースにハーブエキスとビタミンCを配合した、低アルカリ処方の低刺激タイプです。



グリジオ パワーブリーチ

【パウダーブリーチ剤】
（医薬部外品）
内容量 / 300g

10 レベル以上のカラーやハイレベルのブリーチの場合に使用します。パワーブリーチパウダーとミルクィデベロッパーを 1：2 ～ 3 の割合で混合し 15 ～ 30 分放置します。



グリジオ
ミルクィデベロッパー 6

2 剤【過酸化水素 6%】
（医薬部外品）
内容量 / 1200m l

低粘度のミルクィタイプなので、1 剤と混合すると伸びがよく、塗布しやすい粘度です。毛髪に馴染みやすく、早く明度を上げるときに使いやすいタイプです。



グリジオ
AC デベロッパー 6/3

2 剤【過酸化水素 6%】【過酸化水素 3%】
（医薬部外品）
内容量 / 各 1200m l

やや高粘度で1剤と混合しやすく、塗布量調節に便利な垂れ落ちにくいタイプです。アクティブコントロールにより混合直後の過剰反応を抑制することで、頭皮刺激を緩和し、薬剤のニオイをおさえます。

